AVERTISSEMENTS ACRICOLES DLP -2-8-72 418857

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative - 67-084 - STRASBOURG CEDEX Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F
Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs
67-070 - STRASBOURG -CEDEX

Supplément nº1 au Bulletin nº143 du mois d'Août 1972.

1er Août 1972.

ARBRES FRUITIERS /

PRUNIERS

CARPOCAPSE DES PRUNES

Depuis notre note du 24 juillet concernant le Carpocapse des Prunes (2ème génération), l'activité sexuelle des papillons a considérablement augmenté. Les pontes sur fruits sont nombreuses et les premières éclosions des jeunes chenilles sont imminentes. Dans les vergers de mirabelliers et de quetschiers situés en ALSACE, où les dégâts de cet insecte sont à craindre, il est recommandé de traiter dès réception du présent avis.

En LORRAINE, ce traitement pourra être décalé de 2 à 5 jours selon les situations.

Utiliser un produit à base de Phosalone (60 g de MA/hl) ou Azinphos (40 g de MA/hl).

Précisons que la cueillette des prunes à maturité précoce est proche, Par conséquent, il faut tenir compte des délais d'emploi des différents produits.

ARAIGNEES ROUGES (Toutes essences).

Depuis une dizaine de jours, les pullulations d'araignées rouges augmentent sensiblement dans de nombreux vergers, notamment de pommiers et de pruniers. Surveiller attentivement l'évolution de ces acariens, de façon à pouvoir intervenir en cas de nécessité.

Utiliser de préférence un acaricide spécifique contre les formes mobiles ou à la fois contre les oeufs et les formes mobiles (consulter la liste des produits en votre possession).

GRANDES CULTURES

HOUBLON

MILDIOU

L'état sanitaire des cultures houblonnières est dans l'ensemble satisfaisant. On peut, cependant, observer très localement des attaques de Mildiou sur les inflorescences des jeunes rameaux latéraux. Les variétés tardives de houblon atteignant le stade de fin floraison et les variétés précoces étant au stade de début cônaison, il est nécessaire de renouveler la protection fongicide.

200

• • • / • • •

Imprimerie de le Station ALSACE et LORRAINE - Directeur-Gérant : L. BOUYX

On apportera beaucoup de soins à l'exécution de ce traitement, en veillant à bien protéger les rameaux latéraux sur toute la longueur de la liane.

Ce traitement devra être effectué dès réception de cette note.

Précisons qu'à partir de la floraison et jusqu'à la récolte, l'emploi des produits cupriques est à déconseiller. Les résidus de cuivre laissés sur les cônes risquent de gêner la bonne commercialisation de la production.

On fera appel à des organiques de synthèse tels que : Captafol : 180 g/hl ; Mancozèbe : 180 g/hl ; Propinèbe : 220 g/hl.

PUCERONS

Les parcelles traitées au Dimefox sont dans l'ensemble indemnes de Pucerons. Dans les autres parcelles protégées par pulvérisation classique, ajouter si nécessaire, un aphicide à la bouillie anti-Mildiou.

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Les conditions climatiques de la dernière décade du mois de juillet ont été favorables au développement du Mildiou de la pomme de terre (averses orageuses fréquentes et fortes rosées matinales).

Toutefois, la maladie ne présente pas une trop grande gravité, mais risque cependant d'évoluer très rapidement.

Afin de limiter les contaminations du Mildiou sur tubercules, nous conseillons d'exécuter le défanage en débutant par les parcelles les plus atteintes par cette maladie (consulter notre Bulletin n°143 du mois d'Août 1972).

Dans les cultures d'altitude (notamment département des Vosges) ou très en retard au point de vue tubérisation, renouveler le traitement fongicide dans les meilleurs délais.

DORYPHORE

De nouvelles éclosions de larves de Doryphore sont signalées dans le département des Vosges. Si nécessaire, ajouter un insecticide à la bouillie anti-Mildiou.

Les Ingénieurs chargés des Avertissements Agricoles : C. GACHON et Ch. JANUS

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la Circonscription Phytosanitaire "ALSACE et LORRAINE" J. HARRANGER

Dernière Note parue : Bulletin Nº 143 du mois d'Août, publié le ler Août 1972.